

## Przygotowanie pacjenta do znieczulenia w trybie ambulatoryjnym

1. Kwalifikacji do znieczulenia w trybie ambulatoryjnym dokonuje anestezjolog. Pacjent musi mieć wyniki aktualnych badań (do 14 dni wstecz):
  - **Elektrolity (potas , sód)**
  - **Morfologia**
  - **Układ krzepnięcia** – czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy
  - **W przypadku chorób tarczycy** wyniki ostatnich badań **TSH, T3, T4** (ważne przez 6 miesięcy) lub aktualną konsultację endokrynologiczną.
2. Leki zażywane „**na stałe**” przyjmowane są w dniu zabiegu tak jak dotychczas lub według zleceń konsultującego anestezjologa.
3. Pacjent przed znieczuleniem musi wstrzymać się od spożywania posiłków stałych na minimum **6 godzin** i picia płynów na minimum **4 godziny** przed zabiegiem.
4. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu **6 godzin** przed zabiegiem.
5. O wypisie pacjenta do domu decyduje anestezjolog. Przez **24 godziny po** znieczuleniu pacjentowi nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, podejmować ważnych życiowo decyzji oraz spożywać alkoholu.
6. Przez **24 godziny po** znieczuleniu pacjent musi być nadzorowany przez inną dorosłą osobę.
7. Powrót do domu nie może odbywać się miejskim środkiem lokomocji, a pacjentowi w trakcie powrotu do domu musi towarzyszyć odpowiedzialna osoba dorosła.

**Jednym z warunków wypisu do domu jest obecność odpowiedzialnego opiekuna.**