

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII PREPARATEM FORTTRANS

Dieta przed kolonoskopią

- Na trzy dni przed badaniem nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców pestkowych, maku, pieczywa z całymi ziarnami zbóż. Poza tym zwykła dieta.
- W dniu poprzedzającym badanie korzystne jest spożywanie małych posiłków przygotowanych z żywności ubogo resztkowej (ser kremowy, twarożek, jajka, czysty bulion, klarowny kisiel, chleb tostowy, masło, w niewielkich ilościach cukier). **Od godz. 13.00 nie można jeść żadnych posiłków.** Można pić klarowne płyny.
- W dniu badania można pić klarowne płyny (jasne soki owocowe – klarowne, przecedzony wywar warzywny lub mięsny, słaba herbata) **do 6 godz.** przed badaniem.

Przygotowanie roztworu preparatu FORTTRANS:

- 1 dawka: przygotować **2 litry** roztworu Fortrans, rozpuszczając 2 torebki, każdą z torebek w 1 litrze niegazowanej wody.
- 2 dawka: przygotować **2 litry** roztworu Fortrans, rozpuszczając 2 torebki, każdą z torebek w 1 litrze niegazowanej wody.

Przygotowany roztwór preparat **FORTTRANS** przyjmuje się w następujących godzinach:

- **Badanie w godzinach dopołudniowych (od 10.00 do 13.00):**
 - Pierwsza dawka: rozpoczynamy picie od 14.00 dzień przed badaniem, pić jedną szklankę co 15 min.
 - Druga dawka: rozpoczynamy picie od 20.00 dzień przed badaniem, pić jedną szklankę co 15 min.
- **Badanie w godzinach popołudniowych (od 13.00 do 16.00)**
 - Pierwsza dawka: rozpoczynamy picie od 20.00 dzień przed badaniem, pić jedną szklankę co 15 min.
 - Druga dawka: rozpoczynamy picie od 5.00 w dniu badania, pić jedną szklankę co 15 min.
- **Badanie w godzinach popołudniowych (od 16.00 do 19)**
 - Pierwsza dawka: rozpoczynamy picie od 20.00 dzień przed badaniem, pić jedną szklankę co 15 min.
 - Drugą dawkę należy podzielić: rozpoczynamy picie 1 litra od 5.00 w dniu badania, pić jedną szklankę co 15 min, a ostatni litr należy wypić od 9.00.

INFORMACJE OGÓLNE

- osoby przyjmujące leki wpływające na krzepliwość krwi np.: Acard, Polopiryna, Acenocumarol, Sintrom u których planowane jest usuwanie polipów, powinny przerwać ich stosowanie na 5 dni przed badaniem. Należy jednak wcześniej **KONIECZNIE** skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np.: nadciśnienie, choroby serca, tarczyca, padaczka) w dniu badania powinny zażyć te leki wg stałych ustalonych dawek najlepiej 2 godz. przed lub po spożyciu preparatu przeczyszczającego
- osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować się z lekarzem w sprawie przyjmowania leków przeciwcukrzycowych lub insuliny w czasie przygotowania do kolonoskopii oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka

UWAGA !

Po badaniu w znieczuleniu nie wolno prowadzić samochodu ani obsługiwać innych pojazdów mechanicznych.

KONIECZNA JEST OBECNOŚĆ OSOBY TOWARZYSZĄCEJ.